



Gwyddoniaeth Pysgodfeydd a Chadwraeth

# DIWEDDARIAD GWYDDONOL

## Holiadur Gwybodaeth Pysgotwyr: Rhagfyr 2014

Julia Pantin



PRIFYSGOL  
**BANGOR**  
UNIVERSITY

*Ysgol Gwyddorau Eigion, Coleg y Gwyddorau Naturiol, Prifysgol Bangor*

Funded by:



Y Gronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd:  
Buddsoddi mewn Pysgodfeydd Cynaliadwy  
European Fisheries Fund:  
Investing in Sustainable Fisheries



Llywodraeth Cymru  
Welsh Government

## Holiadur Gwybodaeth Pysgotwyr


### Dull

Rydym wedi cwblhau holiaduron gwybodaeth pysgotwyr gyda 64 o bysgotwyr ar draws Cymru, sy'n cynnwys data ar gyfer 78 o longau. Mae'r data yn trafod 33 o longau yng Ngogledd Cymru, 16 o longau yng Nghanolbarth Cymru a 29 o longau yn Ne Cymru. Mae hyn yn hafal i 9944.36 km<sup>2</sup> o foroedd Cymru yn cael eu defnyddio i bysgota.

### Canlyniadau rhagarweiniol


Mae'r graffiau canlynol yn sampl o'r wybodaeth a gafwyd o'r holiadur:

### Rhesymau pam fod pysgotwyr yn dewis lleoliadau pysgota




Lefelau daliadau blaenorol, agosrwydd i'r porthladd a thywydd/cysgod oedd yr atebion a glywyd amlaf pan ofynnwyd i bysgotwyr pam eu bod yn pysgota mewn lleoliadau penodol. Roedd hyn yn gyson ymhlith y pysgotwyr i gyd.

### Amllder newidiadau digonedd a arsylwyd gan bysgotwyr




Sylwyd ar ostyngiadau yn nigonedd yr wyth rhywogaeth; fodd bynnag, sylwyd hefyd ar gynnydd yn y digonedd gan lawer o bysgotwyr o ran cimychiaid a chregyn Aberffro. Nid oes yr un pysgotwr wedi sylwi ar gynnydd yn y digonedd o gorgimychiaid, cwiniaid neu'r cregyn moch mwyaf.

### Amllder newidiadau maint a arsylwyd gan bysgotwyr



Nid yw'r rhan fwyaf o bysgotwyr wedi sylwi ar unrhyw newidiadau ym maint y rhywogaethau ym mhob un o'r wyth rhywogaeth. Mae rhai pysgotwyr, serch hynny, wedi gweld fod maint cimychiaid, draenogiaid y môr a chrancod hirgoes wedi gostwng.

## Gwrthdaro o ddefnydd morol



Gofynnwyd i bysgotwyr os oedd unrhyw ardal ble roedd gwrthdaro gydag eraill oedd yn defnyddio'r môr, a nodwyd 65 ardal o wrthdaro sy'n golygu 3278.12 km<sup>2</sup> o foroedd Cymru. Y gwrthdaro amlycaf i bysgotwyr â gêr sefydlog oedd gyda'r rhai oedd yn defnyddio cewyll fel hobi a gyda physgotwyr o'r un rhywogaeth. Y prif broblemau ynglŷn â gwrthdaro gyda'r rhai oedd yn pysgota fel hobi yw eu bod yn pysgota mwy o gewyll nag y mae eu trwydded yn ei ganiatáu, nid ydynt yn cydymffurfio â deddfwriaeth maint glanio lleiaf, maent yn codi cewyll pysgotwyr masnachol ac yn dwyn cewyll masnachol. Mewn rhai ardaloedd, bu'r gwrthdaro hwn yn bodoli ers dros 20 mlynedd.

Mae pysgotwyr â ger symudol yn ymddangos fel pe baent yn dod wyneb yn wyneb â llai o wrthdaro defnydd morol, a dim ond yn nodi rheoliadau cadwraeth a physgotwyr o'r un rhywogaeth fel gwrthdrawiadau. Mae'r gwrthdaro cadwraeth yn ymwneud ag ardaloedd caeedig cregyn bylchog ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) lle gwaherddir pysgota cregyn bylchog.

### Yn y dyfodol

Byddwn yn parhau i gynnal holiaduron gyda'r gobaith o lenwi rhai o'r bylchau daearyddol ac yn cyrraedd sampl mwy cynrychioladol o'r gwahanol alwedigaethau pysgota. Rydym yn edrych yn arbennig i gynnal holiaduron gyda mwy o bysgotwyr cregyn bylchog a physgotwyr ym Môn, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin. Os ydych yn fodlon cael eich cyfweled neu'n adnabod rhywun arall fyddai'n fodlon gwneud, wnewch chi gysylltu â Julia Pantin drwy ffonio (01248 382607) neu e-bostio ([j.pantin@bangor.ac.uk](mailto:j.pantin@bangor.ac.uk)). Mae cyfle gan bawb sy'n ateb yr holiadur i ennill Trywsus *Bib and Brace Guy Cotten* neu danysgrifiad i "The Fishing News".